

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(小細胞)シスプラチン・イリノテカン療法(1クール28日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL + デキサート注射液9.9mg	div	15分
	② トポテシン注 60mg/m ² + 生理食塩液500mL	div	90分
	③ 硫酸Mg1mEq/mL 8mL + ソルデム3A500mL	div	60分
	④ マンニトールS 200 mL	div	30分
	⑤ シスプラチン注 60mg/m ² + 生理食塩液250mL	div	60分
	⑥ ソルデム3A500mL	div	60分
d8,d15	① グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL + デキサート注射液6.6mg	div	15分
	② トポテシン注 60mg/m ² + 生理食塩液500mL	div	90分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

Day1は入院で実施。
Day2,3にアプレピタント80mg内服。
Day2-4 デキサメサゾン8mg/日内服。
必要時、Da9-10、Day16-17にデキサメサゾン4mg/日内服。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)