

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(非小細胞)カルボプラチン+nab[®]クリタキセル療法療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL+デキサート注射液4.95mg	div	15分
	② 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	③ アブラキサン点滴静注100mg/m ² +生食20mL/m ² インラインフィルター不可 払い出し容器は、100mLボトル 最終濃度は5mg/mL	div	30分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑤ カルボプラチン点滴静注液AUC6+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	⑥ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d8,d15	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② アブラキサン点滴静注100mg/m ² +生食20mL/m ² インラインフィルター不可 払い出し容器は、100mLボトル 最終濃度は5mg/mL	div	30分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	アブレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

Day2,3にアブレピタント80mg内服。必要に応じてDay8,15のアブラキサン前に
デキサメタゾン投与可。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)