

# がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(非小細胞)ラムシルマブ・ドセタキセル療法(1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① デキサート注射液6.6mg+生理食塩液50mL 開始と同時にレスタミン錠50mg内服	div	30分
	② サイラムザ点滴静注液10mg/kg+生理食塩液250mL 0.2または0.22 $\mu$ mのフィルターを用いて投与 調製後13時間以内に投与終了 希釈後の濃度は0.4~4mg/mLとする 2回目以降は30分で投与可能	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ ドセタキセル点滴静注60mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	⑤ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	レスタミンコーワ錠10mg 5錠 Rp.1開始と同時に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

Rp.1開始と同時にレスタミン錠50mg内服。サイラムザ投与時0.2または0.22  $\mu$  mのインラインフィルター使用。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)