

# がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(非扁平上皮)CDDP・PEM+ペムブロリズマブ療法(1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② キイトルーダ点滴静注200mg+生理食塩液50mL 0.22 $\mu$ mのインラインフィルターを使用	div	30分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+生理食塩液50mL	div	15分
	⑤ アリムタ注射用 500mg/m <sup>2</sup> +生理食塩液100mL	div	10分
	⑥ 硫酸Mg1mEq/mL 8mL+ソルデム3A500mL	div	60分
	⑦ マンニトールS 200 mL	div	30分
	⑧ シスプラチン注75mg/m <sup>2</sup> +生理食塩液250mL	div	60分
	⑨ ソルデム3A500mL	div	60分

d1 アプレピタントカプセル 125mg  
抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服

プロトコール適応時表示コメント

葉酸(0.5mg/日)を連日、VB12(1mg)を9週毎に投与。Day2,3アプレピタント  
80mg内服。4コースまで。

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄)