

# がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(小細胞)CBDCA+VP-16+Atezo併用療法療法(1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② テセントリク点滴静注1200mg+生理食塩液250mL 問題なければ2回目以降30分に短縮可。 0.2または0.22 $\mu$ mのインラインフィルターを使用。	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL+デキサート注射液4.95mg	div	15分
	⑤ エトポシド点滴静注液100mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液500mL	div	120分
	⑥ カルボプラチン点滴静注液AUC5+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	⑦ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d2,d3	① デキサート注射液3.3mg+生理食塩液50mL	div	15分
	② エトポシド点滴静注液100mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液500mL	div	120分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

Day2,3アプレピタント80mg内服。Day4 DEX4mg内服(省略可)4コース施行後はアテゾリズマブ単剤による維持療法に移行する。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)