

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(非扁平上皮) CBDCA+PEM+Atezolizumab療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② テセントリク点滴静注1200mg+生理食塩液250mL 問題なければ2回目以降30分に短縮可。 0.2または0.22 μ mのインラインフィルターを使用。	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL+デキサート注射液4.95mg	div	15分
	⑤ アリムタ注射用 500mg/m ² +生理食塩液100mL	div	10分
	⑥ カルボプラチン点滴静注液AUC6+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	⑦ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

葉酸(0.5mg/日)を連日、VB12(1mg)を9週毎に投与。Day2,3アプレピタント80mg内服。4-6サイクル後PEM+Atezo維持療法に移行。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)