

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(扁平上皮) CDDP+GEM+Necitumumab併用療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② ポートラーザ点滴静注液800mg+生理食塩液200mL 調製後5時間以内に投与終了	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+生理食塩液50mL	div	15分
	⑤ ジェムザール注1250mg/m ² +生理食塩液100mL	div	30分
	⑥ 硫酸Mg1mEq/mL 8mL+ソルデム3A500mL	div	60分
	⑦ マンニトールS 200 mL	div	30分
	⑧ シスプラチン注75mg/m ² +生理食塩液250mL	div	60分
	⑨ ソルデム3A500mL	div	60分
d8	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② ポートラーザ点滴静注液800mg+生理食塩液200mL 調製後5時間以内に投与終了	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ デキサート注射液6.6mg+生理食塩液50mL	div	15分
	⑤ ジェムザール注1250mg/m ² +生理食塩液100mL	div	30分
	⑥ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

ゲムシタビンは1000mg/m²に減量可。Day2,3アプレピタント80mg内服。Day2-4DEX8mg内服。

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄)