

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(非小細胞) 術前CBDCA+PTX+Nivolumab療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① アロカリス点滴静注235mg+グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL+デキサート注射液9.9mg+ファモチジン静注20mg 点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服	div	-
	② 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	③ オブジーボ点滴静注360mg+生理食塩液100mL 投与時は0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを用いる。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。	div	30分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑤ パクリタキセル注射液175mg/m ² +生理食塩液500mL 0.2または0.22 μ mのインラインフィルター使用。	div	180分
	⑥ カルボプラチン点滴静注液AUC5+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	⑦ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	レスタミンコーワ錠10mg 5錠	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

術前に3サイクル施行。Rp.1点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服。d2-4デキサメタゾン4mg内服可。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)