

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(扁平上皮) 術前CDDP+GEM+Nivolumab療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② オプジーボ点滴静注360mg+生理食塩液100mL 投与時は0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを用いる。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。	div	30分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ アロカリス点滴静注235mg+パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液 9.9mg+生理食塩液50mL	div	30分
	⑤ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑥ ジェムザール注1000mg/m ² +生理食塩液100mL	div	30分
	⑦ 硫酸Mg1mEq/mL 8mL+ソルデム3A500mL	div	60分
	⑧ マンニトールS 200 mL	div	30分
	⑨ シスプラチン注75mg/m ² +生理食塩液250mL	div	60分
	⑩ ソルデム3A500mL	div	60分
d8	① デキサート注射液6.6mg+生理食塩液50mL	div	15分
	② ジェムザール注1000mg/m ² +生理食塩液100mL	div	30分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分

プロトコール適応時表示コメント

術前に3サイクル施行。d2-4デキサメタゾン8mg内服。Day1は入院で実施。

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄)