

がん化学療法処方

プロトコール名: 肺癌(非扁平上皮) 術前CBDCA+PEM+Nivolumab療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

| 投与日 d1 | 薬品名 | 投与経路 | 投与時間 |
|-----------|--|------|------|
| | ① 生理食塩液 50mL(プライミング用) | div | - |
| | ② オプジーボ点滴静注360mg+生理食塩液100mL 投与時は0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを用いる。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。 | div | 30分 |
| | ③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用) | div | 5分 |
| | ④ アロカリス点滴静注235mg+グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL+デキ サート注射液4.95mg | div | 30分 |
| | ⑤ ペメトレキセド点滴静注液NK 500mg/m ² +生理食塩液100mL | div | 10分 |
| | ⑥ カルボプラチン点滴静注液AUC5+5%ブドウ糖液250mL | div | 60分 |
| | ⑦ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用) | div | 5分 |

プロトコール適応時表示コメント

術前に3サイクル施行。葉酸(0.5mg/日)を連日、VB12(1mg)を9週毎に投与。
d2-4デキサメタゾン4mg内服可。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)