


# NSCLC CBDCA+nab-PTX+トレメリムマブ+デュルバルマブ療法

NSCLC CBDCA+nab-PTX+トレメリムマブ+デュルバルマブ療法は、カルボプラチンとnab-パクリタキセル、トレメリムマブ、デュルバルマブを使用する治療法です。カルボプラチンとトレメリムマブ、デュルバルマブを週に1回1日目に投与し、その後3週間お休みします。nab-パクリタキセルは週に1回1,8,15日目に投与します。このスケジュールを4コースまで繰り返します。強い副作用が出た場合や、患者様の状態によっては、治療を延期したり、減量したりすることがあります。



### 治療(1日目)

0	プライミング	生理食塩液
5	免疫チェックポイント阻害薬	トレメリムマブ75mgを60分で点滴します
65	フラッシュ※	
95	免疫チェックポイント阻害薬	デュルバルマブ1500mgを60分で点滴します (体重30kg以下の場合20mg/kg)
155	フラッシュ※	
160	吐き気止めアレルギー予防	ホスネツピタント、グラニセトロン、デキサメタゾン
190	フラッシュ※	
195	抗がん薬	nab-パクリタキセル100mg/m <sup>2</sup> を30分で点滴します
225	フラッシュ※	
230	抗がん薬	カルボプラチン AUC5を60分で点滴します
290	フラッシュ※	
295	フラッシュ※	生理食塩液

分(目安)

### 治療(8、15日目)

0	プライミング	生理食塩液
5	抗がん薬	nab-パクリタキセル100mg/m <sup>2</sup> を30分で点滴します
35	フラッシュ※	
40	フラッシュ※	生理食塩液

分(目安) ※点滴ラインに残ったお薬を流します

当レジメンの開始日 年 月 日

体表面積  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

\* 薬剤は一般名で記載しています。