

# がん化学療法処方

プロトコール名： 大腸癌ベバシズマブ・SOX療法(1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② ベバシズマブBS点滴静注7.5mg/kg + 生理食塩液100mL 初回は90分投与 2回目以降は問題なければ60分投与可能 さらに問題なければ30分投与可能	div	90分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+5%ブドウ糖液50mL	div	15分
	⑤ エルプラット点滴静注液 130mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖液500mL	div	120分
	⑥ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1-14	エスワン80mg/m <sup>2</sup> 1日2回朝夕食後 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25m <sup>2</sup> 未満: 80mg/日 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満: 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上: 120mg/日	po	-

プロトコール適応時表示コメント

S-1投与量は体表面積1.25m<sup>2</sup>未満; 80mg/day, 1.25m<sup>2</sup>以上1.5m<sup>2</sup>未満; 100mg/day, 1.5m<sup>2</sup>以上; 120mg/day(day1 夕食後からday15 朝食後まで服用)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)