

# がん化学療法処方

プロトコール名： 大腸癌SIRB療法(1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② ベバシズマブBS点滴静注7.5mg/kg + 生理食塩液100mL 初回は90分投与 2回目以降は問題なければ60分投与可能 さらに問題なければ30分投与可能	div	90分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液6.6mg+生理食塩液50mL	div	15分
	⑤ トポテシン注150mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖液250mL	div	90分
	⑥ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1-14	エスワン80mg/m <sup>2</sup> 1日2回朝夕食後 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25m <sup>2</sup> 未満：80mg/日 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満：100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上：120mg/日	po	-

プロトコール適応時表示コメント

S-1：d1-14に80 mg/m<sup>2</sup>/day (分2)で内服。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)