

がん化学療法処方

プロトコール名： BRAF変異大腸癌エンコラフェニブ[®] + ビニメチニブ[®] + Cmab療法 (毎週) (1クール7日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① デキサート注射液6.6mg + 生理食塩液100mL (点滴開始と同時にレスタミン錠10mgを5錠内服)	div	30分
	② アービタックス注射液400mg/m ² + 生理食塩液500mL	div	120分
	③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ用)	div	12分
(2コース目以降)			
d1	① デキサート注射液6.6mg + 生理食塩液100mL (点滴開始と同時にレスタミン錠10mgを5錠内服)	div	30分
	② アービタックス注射液250mg/m ² + 生理食塩液250mL	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ用)	div	12分
d1-7	メクトビ錠 45 mg/回 1日2回	p.o.	-
d1-7	ビラフトビカプセル 300mg/回 1日1回	p.o.	-

プロトコール適応時表示コメント

Day1-7メクトビ45mg/回 1日2回、ビラフトビ 300mg/回 1日1回内服。Binimetinibは省略可。
Rp.1 点滴開始と同時にレスタミン10mgを5錠内服。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)