

がん化学療法処方

プロトコール名： 大腸癌Bmab+TFTD療法(1クール28日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1,15	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② ベバシズマブBS点滴静注5mg/kg+生理食塩液100mL 初回は90分投与 2回目以降は問題なければ60分投与可能 さらに問題なければ30分投与可能	div	90分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1-5, d8-12	① ロンサーフ 70 mg/m ² /day, 1日2回朝夕食後内服	po	-

ロンサーフは体表面積(m²)に合わせて下記の用量とする。
1.07未満 35mg/回(70mg/日)
1.07以上~1.23未満 40mg/回(80mg/日)
1.23以上~1.38未満 45mg/回(90mg/日)
1.38以上~1.53未満 50mg/回(100mg/日)
1.53以上~1.69未満 55mg/回(110mg/日)
1.69以上~1.84未満 60mg/回(120mg/日)
1.84以上~1.99未満 65mg/回(130mg/日)
1.99以上~2.15未満 70mg/回(140mg/日)
2.15以上 75mg/回(150mg/日)

プロトコール適応時表示コメント

d1-5,8-12 ロンサーフ 70mg/m²/day 1日2回朝夕食後内服

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄)