

がん化学療法処方

プロトコール名: 乳癌ペルツズマブ+トラスツズマブ+DTX療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日 d1	薬品名	投与経路	投与時間
	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② (初回)パージェタ点滴静注840mg+生理食塩液250mL (2回目以降)パージェタ点滴静注420mg+生理食塩液250mL 初回導入時は60分で投与し、2回目以降問題なければ 30分で投与可。	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ (初回)トラスツズマブBS点滴静注8mg/kg+生理食塩液250mL (2回目以降)トラスツズマブBS点滴静注6mg/kg+生理食塩液250mL すでに導入済みの場合は6mg/kg 初回導入時は90分で投与し、2回目以降問題なければ 30分で投与可。	div	90分
	⑤ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑥ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL+デキサート注射液6.6mg	div	15分
	⑦ ドセタキセル点滴静注75mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL	div	90分
	⑧ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分

プロトコール適応時表示コメント

ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル3剤とも21日を1クール。制吐剤としてHT-3antagonistやデキサメタゾンを入れる。

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄)