

がん化学療法処方

プロトコール名: 乳癌 トラスツズマブ+カルボプラチン+DTX療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL+デキサート注射液4.95mg	div	15分
	② ドセタキセル点滴静注75mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	③ カルボプラチン点滴静注液AUC6+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑤ (初回)トラスツズマブBS点滴静注8mg/kg+生理食塩液250mL (2回目以降)トラスツズマブBS点滴静注6mg/kg+生理食塩液250mL 初回導入時は90分で投与し、2回目以降問題なければ 30分で投与可。	div	90分
	⑥ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与の1時間~1時間半前に内服	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

計6コース実施後、乳癌トラスツズマブ単独3週毎療法を行う。d2-3にアプレピタント80mg内服。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)