

がん化学療法処方

プロトコール名: 乳癌 PEMB(6w)+PTX療法(1クール84日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1,d43	① デキサート注射液6.6mg+ファモチジン静注20mg+生理食塩液50mL 点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服	div	10分
	② 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	③ キイトルーダ点滴静注400mg+生理食塩液50mL インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	div	30分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑤ パクリタキセル注射液90mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL インラインフィルターを用いて投与する。	div	60分
	⑥ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d8,d15, d29,d36 d57,d64, d71	① デキサート注射液6.6mg+ファモチジン静注20mg+生理食塩液50mL 点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服	div	10分
	② 生理食塩液100mL	div	30分
	③ パクリタキセル注射液90mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL インラインフィルターを用いて投与する。	div	60分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1,d8,d15, d29,d36,d 43,d57, d64,d71	レスタミンコーワ錠10mg 5錠	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

パクリタキセル投与30分前までにレスタミン錠50mg内服。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)