

がん化学療法処方

プロトコール名: 乳癌 術前PEMB+PTX+CBDCA療法 (1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+ファモチジン静注20mg +生理食塩液50mL 点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服	div	10分
	② 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	③ キイトルーダ点滴静注200mg+生理食塩液50mL 最終濃度を1~10mg/mLとする。 インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	div	30分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑤ パクリタキセル注射液80mg/m ² +生理食塩液250mL インラインフィルターを用いて投与する。	div	60分
	⑥ カルボプラチン点滴静注液AUC1.5+生理食塩液250mL	div	30分
	⑦ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d8,d15	① パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+ファモチジン静注20mg +生理食塩液50mL 点滴開始と同時にレスタミン錠50mg内服	div	10分
	② 生理食塩液100mL	div	30分
	③ パクリタキセル注射液80mg/m ² +生理食塩液250mL インラインフィルターを用いて投与する。	div	60分
	④ カルボプラチン点滴静注液AUC1.5+生理食塩液250mL	div	30分
	⑤ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1,d8,d15	レスタミンコーワ錠10mg 5錠	p.o.	

プロトコール適応時表示コメント

術前にPEMB+PTX+CBDCA療法を4コース、PEMB+AC療法を4コース投与。d2-3,9-10,16-17にDEX8mg内服。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)