

がん化学療法処方

プロトコール名 : 膵癌 FOLFIRINOX療法 (1クール14日)

(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① アロカリス点滴静注235mg+パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液 9.9mg+5%ブドウ糖液50mL	div	30分
	② エルプラット点滴静注液 85mg/m ² + 5%ブドウ糖液250mL	div	120分
	③ レボホリナート点滴静注 200mg/m ² + 5%ブドウ糖液250mL	div	120分
	④ トポテシン注 180mg/m ² + 5%ブドウ糖液250mL レボホリナートとトポテシンは同時滴下開始 トポテシン側が早く終了する	div	90分
	⑤ フルオロウラシル注 400mg/m ² + 5%ブドウ糖液50mL 全量を50mlとして急速点滴	div	5分
	⑥ 5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用)	div	5分
	⑦ フルオロウラシル注 2,400mg/m ² + 5%ブドウ糖液100mL 携帯用ポンプで全量100mlに調製	div	2760分

プロトコール適応時表示コメント

day2,3にデカドロン錠 4mg/日を内服

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄: