

がん化学療法処方

プロトコール名 胆道癌GCS療法(1クール14日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① ソルデム3A輸液500mL メインルートRp.1	div	60分
	② 生理食塩液500mL メインルートRp.2	div	60分
	③ パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+生理食塩液50mL 側管ルート Rp.1	div	15分
	④ シスプラチン注25mg/m ² + 生理食塩液250mL 側管ルートRp.2	div	60分
	⑤ ジェムザール注 1000mg/m ² + 生理食塩液100mL 側管ルートRp.3	div	30分
	⑥ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) 側管ルートRp.4	div	5分
day1-7	① エスワン80mg/m ² 1日2回朝夕食後 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満:100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日 Ccrが60 ml/min未満の場合はS-1を1段階減量して60mg/m ² /bodyで投与	po	-

プロトコール適応時表示コメント

day1-7 S-1 80mg/m²内服。Ccr 60mL/min未満の場合は減量して60mg/m²。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)