

# がん化学療法処方

プロトコール名 胆道癌 GC+デュルバルマブ併用療法(1クール21日)  
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用) メインルートRp.1	div	-
	② イミフィンジ点滴静注1500mg + 生理食塩液250mL 体重30kg以下の場合、20mg/kgとする。 最終濃度を1~15mg/mLとする。 調製後13時間以内に投与終了。 投与時0.2又は0.22μmインラインフィルターを使用。 メインルートRp.2	div	60分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用) メインルートRp.3	div	5分
	④ ソルデム3A輸液 500mL メインルートRp.4	div	60分
	⑤ 生理食塩液500mL メインルートRp.5	div	60分
	⑥ パロノセトロン静注0.75mg+ デキサート注射液9.9mg +生理食塩液50mL 側管ルートRp.1 メインルートRp.4のソルデム3A以降に開始	div	15分
	⑦ シスプラチン注25mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩液250mL 側管ルートRp.2	div	60分
	⑧ ジェムザール注 1000mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩液100mL 側管ルートRp.3	div	30分
	⑨ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) 側管ルートRp.4	div	5分
d8	① ソルデム3A輸液 500mL メインルートRp.1	div	60分
	② 生理食塩液500mL メインルートRp.2	div	60分
	③ パロノセトロン静注0.75mg+ デキサート注射液9.9mg +生理食塩液50mL 側管ルートRp.1	div	15分
	④ シスプラチン注25mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩液250mL 側管ルートRp.2	div	60分
	⑤ ジェムザール注 1000mg/m <sup>2</sup> + 生理食塩液100mL 側管ルートRp.3	div	30分
	⑥ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) 側管ルートRp.4	div	5分

プロトコール適応時表示コメント

BW30kg以下の場合、デュルバルマブは20mg/kg。最大8サイクル実施後、デュルバルマブ単独療法(1500mg 4週毎)へ

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)